

Universitas Ngudi Waluyo

Karya Tulis Ilmiah

Nur Vira Setianingrin*, Ana Puji Astuti, Eka Adimayanti*****

PENGELOLAAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF PADA NY. D DENGAN *POST PARTUM* SPONTAN INDIKASI KETUBAN PECAH DINI DI RUANG FLAMBOYAN RSUD UNGARAN

xiv + 93 halaman + 1 bagan + 7 tabel + 8 lampiran

ABSTRAK

Menyusui merupakan hal sangat penting bagi seorang ibu untuk bayinya, karena ASI memiliki banyak nutrisi yang berguna untuk kecerdasan bayi. Asupan terbaik untuk bayi yaitu ASI (Air Susu ibu) karena memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase pemberian ASI saja dalam 24 jam terakhir (ASI Eksklusif) semakin menurun seiring meningkatnya umur bayi dengan persentase terendah pada anak umur 6 bulan. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan tentang Pengelolaan Menyusui Tidak Efektif pada Ny. R dengan Post Partum Spontan Indikasi Ketuban Pecah Dini.

Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah dengan memberikan pengelolaan berupa perawatan pasien dalam memenuhi kebutuhan menyusui tidak efektif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan metodologi keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi. Tindakan yang dilakukan meliputi pemberian pijat oksitosin dan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif.

Hasil pengelolaan menyusui tidak efektif belum tercapai, sehingga masalah menyusui tidak efektif belum teratasi. Rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu pemberian pijat oksitosin dan melibatkan suami dan keluarga dalam memperlancar ASI.

Saran penulis bagi pasien diharapkan agar melakukan teknik pijat oksitosin dan melakukan pemberian ASI sesering mungkin tanpa dibatasi.

Kata kunci : Menyusui Tidak Efektif, *Post Partum* Spontan, Ketuban Pecah Dini

Kepustakaan : 65 (2010-2020)

Universitas Ngudi Waluyo

Karya Tulis Ilmiah

Nur Vira Setianingrin*, Ana Puji Astuti, Eka Adimayanti*****

BREASTFEEDING MANAGEMENT IS NOT EFFECTIVE IN NY. R WITH A SPONTANEOUS POST PARTUM INDICATION OF EARLY CHILDREN'S FERTILIZER IN FLAMBOYAN SPACE UNGARAN HOSPITAL

xiv + 93 pages + 1 bagan + 7 tables + 8 Attachments

ABSTRACT

Breastfeeding is very important for a mother for her baby, because breast milk has many nutrients that are useful for infant intelligence. The best intake for babies is breast milk (breast milk) because it has all the nutrients needed for optimal growth and growth. Based on data from the Basic Health Research in 2013, it showed that the percentage of breastfeeding alone in the last 24 hours (exclusive breastfeeding) decreased with increasing infant age with the lowest percentage in children aged 6 months. The purpose of this paper is to describe the ineffective management of breastfeeding in Ny. R with Spontaneous Post Partum Indication of Amniotic Rupture.

The method used in scientific papers is to provide management in the form of patient care to meet the needs of breastfeeding ineffective. Data collection techniques were performed using a nursing methodology approach including assessment, nursing diagnosis, nursing intervention, nursing implementation and evaluation. Actions taken include giving oxytocin massage and providing health education about exclusive breastfeeding.

Management results achieved are not effective breastfeeding, ASI production has not been smooth.

The author's advice for patients is to make the oxytocin massage technique and breastfeed as often as possible without being limited

Key Words : Ineffective Breastfeeding, Spontaneous Post Partum, Early Amniotic Rupture

Literature : 65 (2010-2020)