

Universitas Ngudi Waluyo
Karya Tulis Ilmiah, September 2020
Anggi Agustina*, Mukhamad Mustain*, Maksum*

Pengelolaan Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Perifer Pada Ny.S Dengan Post ORIF Hari Ke-III Atas Indikasi Fraktur Femur Dextra 1/3 Distal di Ruang Cempaka RSUD Ungaran
xiv + 61 Halaman + 8 Tabel + 1 Bagan + 4 Lampiran

ABSTRAK

Fraktur adalah patahnya kontinuitas tulang dan menentukan jenis dan luas tulang, akan terjadi apabila tulang tidak kuat menahan tekanan yang diberikan pada tulang. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui ketidakefektifan perfusi jaringan perifer pada Ny.S dengan post ORIF hari ke-III atas indikasi fraktur femur dextra 1/3 distal di Ruang Cempaka RSUD Ungaran.

Hasil pengelolaan didapatkan adanya edema pada bagian femur yang merupakan post ORIF hari ke-III. Dan dapat menyebabkan masalah komplikasi lain akibat dari adanya ketidakefektifan perfusi jaringan perifer pada pasien.

Saran bagi perawat di rumah sakit agar menerapkan rutin observasi mengenai keadaan pasien post op ORIF yang mungkin bisa saja terjadi perubahan kondisi pada pasien.

Kata Kunci : Latihan ROM, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer
Kepustakaan : 51 (2010-2019)

Universitas Ngudi Waluyo
Scientific Paper, September 2020
Anggi Agustina * , Mukhamad Mustain * , Maksum *

The Management of The Ineffectiveness of Peripheral Tissue Perfusion in Mrs.S Suffering from Third-day Post ORIF with the Indication of Femur 1/3 Distal Dextra Fracture in Cempaka Room, Ungaran Regional Hospital
xiv + 61 Pages + 8 Tables + 1 Chart + 4 appendices

ABSTRACT

Fracture is the broken continuity of the bone. Based on type and size of the bone, bone can break when it is not strong enough to withstand the pressure applied to the bone. The purpose of this research was to determine the management of the ineffectiveness of peripheral tissue perfusion in Mrs.S suffering from third-day post ORIF with the indication of femur 1/3 distal dextra fracture in Cempaka room, Ungaran Regional Hospital.

Management results obtained swollen femur on the third-day post ORIF. It can cause complications due to the ineffectiveness of peripheral tissue perfusion in the patient.

A suggestion for nurses in the hospital is to be able to carry out routine observations in post-operative ORIF patients that might experience changing condition.

Keywords : ROM exercise, ineffectiveness of peripheral tissue perfusion
Literatures : 51 (2010-2019)