

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari 16 sampel didapatkan sebanyak 15 kasus DRPs efek obat tidak optimal karena tidak sesuai *Guidelines* (M.1.1 – P.1.2) dan sebanyak 16 kasus DRPs ada indikasi tetapi tidak diberi terapi (M.1.3 - P.1.6).
2. Rekomendasi terapi dari hasil analisis DRPS pada kasus terapi DM dengan HbA1c > 9 menggunakan terapi insulin dan antidiabetika oral. Sedangkan terapi DM dengan HbA1c >7-9 menggunakan terapi Kombinasi 2 obat. Pada terapi hipertensi direkomendasikan menggunakan terapi golongan ACEI (Ramipril) karena ACEI (ramipril) merupakan terapi lini pertama pada pasien DM dengan HT. Pada terapi dislipidemia direkomendasikan menggunakan Golongan Statin.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai pola DRPs pada pasien Diabetes Mellitus type 2 peserta prolanis.
2. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disarankan agar pihak Puskesmas Warureja mempunyai standar acuan untuk terapi pengobatan DM.