

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Responden yang mengalami asfiksia neonatorum sebanyak 44 responden (50%) dan tidak mengalami asfiksia neonatum sebanyak 44 responden (50%). Umur kehamilan preterm/posterm sebanyak 46 responden (52,3%) dan aterm sebanyak 42 responden (47,7%). Riwayat persalinan tidak normal sebanyak 45 responden (51,1%) dan normal sebanyak 43 responden (48,9%).
2. Ada hubungan antara umur kehamilan dengan kejadian asfiksia neonatorum (*p-value*  $0,001 < \alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak)
3. Ada hubungan antara riwayat persalinan dengan kejadian asfiksia neonatorum (*p-value*  $0,010 < \alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak)

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Bagi Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang diharapkan agar lebih meningkatkan penyuluhan bagi ibu hamil tentang pentingnya *antenatal care* dengan memberikan pelayanan yang sesuai standar yang sudah ditentukan.

2. Bagi Universitas Ngudi Waluyo diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengembangan keilmuan tentang umur ibu dan riwayat persalinan yang dapat menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengkajian dan penelitian lebih lanjut dengan meneliti faktor-faktor lain penyebab asfiksia pada bayi baru lahir dan penelitian selanjutnya menggunakan data primer.