

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi Farmasi
Skripsi, September 2020
Lisa Septiana Putri
050116A046

PROFIL PENGGUNAAN OBAT ANTIDEPRESAN DI RUMAH SAKIT JIWA

ABSTRAK

Latar Belakang: Depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan mood, memiliki perasaan bersalah terhadap sesuatu, dan keinginan untuk bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat antidepresan di Rumah Sakit Jiwa.

Metode: Penelitian ini non-ekperimental dengan menggunakan metode meta analisis dan data yang diperoleh dari 5 literatur jurnal dengan membandingkan data rekam medis. Untuk memenuhi persyaratan dalam penelitian ini, literatur yang digunakan mengacu pada profil penggunaan obat antidepresan pada pasien depresi di Rumah Sakit Jiwa.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan profil penggunaan obat antidepresan di Rumah Sakit Jiwa yang paling banyak digunakan adalah Fluoxetine dan Sertaline golongan antidepresan *Selectif Serotonin Reuptake Inhibitor* (SSRI). Terapi pada keparahan moderat menggunakan terapi fluoxetine dan triheksifenidil. Pada keparahan mayor menggunakan terapi Fluoxetine dan Risperidon. Keparahan minor menggunakan terapi Sertaline dan klozapin. Rute pemberian yang sering digunakan yaitu peroral yang mudah untuk digunakan.

Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa antidepresan yang sering dipakai pada terapi tunggal yaitu fluoxetine dan setraline. Pada pasien yang menderita depresi dengan tingkat keparahan menggunakan 2 kombinasi obat. Obat kombinasi yang digunakan yaitu triheksifenidil, risperido, dan klozapin.

Kata Kunci: Depresi, Antidepresan, Rute Pemberian

Literatur: 42 (2010-2020)

Ngudi Waluyo University
Study Program of Pharmacy, Faculty of Health Sciences
Final Assignment, September 2020
Lisa Septiana Putri
050116A046

PROFILE OF THE USE OF ANTIDEPRESSANT DRUGS IN A MENTAL HOSPITAL

ABSTRACT

Background: Depression is a mental disorder characterized by mood swings, feeling guilty about something, and a desire to kill yourself. This research aims to find out the pattern of use of antidepressant drugs in asylums.

Method: The study was non-experimental using meta-analysis methods and data obtained from 5 journal literature by comparing medical record data. To meet the requirements in this study, the literature used refers to the profile of the use of antidepressant drugs in depressed patients in asylums.

Result: The results showed the most widely used antidepressant drug use profile in asylums were fluoxetine and sertraline group antidepressant *Selectif Serotonin Reuptake Inhibitors* (SSRI). Therapy at moderate severity using fluoxetine and trihexyphenidyl therapy. At major severity use fluoxetine and risperidone therapy. A frequently used delivery route is peroral that is easy to use.

Conclusion: It can be concluded that antidepressants that are often used in a single therapy are flupoxetine and sertraline. In patients suffering from depression with severity use 2 combinations of drugs. The combination drug used are trihexyphenidyl, risperidone, and clozapine.

Keywords: Depression, Antidepressants, Feeding Routes

Literature: 42 (2010-2020)