

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas 1 Kedung pola terapi yang digunakan pada pengobatan DM tipe 2 yaitu menggunakan obat tunggal (metformin) dan kombinasi (metformin+glimepirid) dimana obat tunggal sebanyak 1 kasus (6,25%) dan obat kombinasi sebanyak 15 kasus (93,75%).
2. Dari 16 pasien DM tipe 2 peserta prolanis Puskesmas Kedung 1, didapatkan DRPs sebanyak 15 kasus (93,7%) pada diagnosa DM, pada diagnosa hipertensi sebanyak 11 kasus (68,75%), dan pada diagnosa dislipidemia sebanyak 14 kasus (87,5%).

#### **B. SARAN**

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis DRP's agar Puskesmas Kedung 1 mempunyai standart acuan untuk terapi pengobatan DM tipe 2 peserta prolanis dan penderita DM tipe 2 dengan komorbiditas.
2. dari hasil penelitian yang telah dilakukan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai DRP's pada penderita DM tipe 2 agar mencapai target/efek terapi yang diharapkan.

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya.