

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari literature review kelima jurnal menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia pada bayi baru lahir meliputi KPD, BBLR, usia ibu, partus lama, primiparitas, demam ibu, kehamilan diinduksi, hipertensi, anemia, perdarahan antepartum, riwayat kematian bayi sebelumnya, malpresentasi, ketuban pecah dini bercampur meconium, pre eklamsia, prolapse tali pusat, prematuritas, diabetes gestasional, diabetes mellitus, plasenta previa, status sosial ekonomi, riwayat aborsi, riwayat persalinan lama, disproporsi sefalopelvis, hipotensi ibu, amniotomi.

Berdasarkan hasil review artikel faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia pada bayi baru lahir dapat disimpulkan:

1. Terdapat pengaruh KPD terhadap kejadian asfiksia pada bayi baru lahir
2. Terdapat pengaruh partus lama terhadap kejadian asfiksia pada bayi baru lahir
3. Terdapat pengaruh BBLR terhadap kejadian asfiksia pada bayi baru lahir

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan lebih banyak dalam pengumpulan artikel yang terbaru agar data yang diperoleh lebih *update* dan beragam.
2. Perlu dilakukan *screening* yang lebih ketika pengumpulan artikel review agar memudahkan pengambilan data.