

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah digunakan peneliti dengan judul'' hubungan lama pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan dengan keputihan di PMB Nita Lisdiyanti Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Jawa Barat'' maka hasil penelitian yang didapatkan dari 125 responden dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar responden dengan lama pemakain kontrasepsi suntik 3 bulan > 6 bulan berjumlah 87 responden (69,6%) di PMB Nita Lisdiyanti.
2. Sebagian besar responden yang mengalami keputiha sebanyak 77 (61,6%) di PMB Nita Lisdiyanti .
3. Di dapatkan hasil uji chi-square bahwa nilai p value = 0,000 > α (0,05), artinya ada hubungan lama pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan di PMB Nita Lisdiyanti.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor lain yang berhubungan dengan keputihan ibu seperti menjaga kebersihan pada vagina ibu.
2. Diharapkan bagi ibu akseptor KB suntik 3 bulan untuk memahami efek samping KB suntik 3 bulan dan menjaga kebersihan pada vagina ibu.
3. Bagi Bidan diharapkan untuk memberikan informasi tentang efek samping KB suntik 3 bulan dan memberikan motivasi pada ibu untuk memahami efek samping KB dan cara menanganinya.

4. Bagi Masyarakat khususnya calon akseptor Keluarga Berencana agar lebih memahami efek samping KB suntik 3 bulan sehingga tidak mempunyai persepsi yang salah tentang KB suntik.