

Universitas Ngudi waluyo
Fakultas Ilmu Kesehatan
Program Studi Kebidanan Program Sarjana
Skripsi, Februari 2021
Windi Yulita sari
152191249

HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN RUPTURE PERINEUM PADA IBU BERSALIN NORMAL DI RS AZ-ZAHRA KALIREJO LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK

Latar Belakang: Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang dapat hidup di luar dari rahim melalui jalan lahir. *Rupture perineum* merupakan robekan pada ruang berbentuk jajaran genjang yang terletak dibawah dasar panggul yang terjadi secara alami tanpa tindakan pada saat persalinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan paritas dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin normal di RS Az-Zahra Kalirejo Lampung Tengah pada tahun 2020.

Metode: Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 320 ibu bersalin normal dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling atau sampel jenuh. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu data rekam medis dengan analisis univariat dan bivariat.

Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin di Rumah Sakit Az-Zahra Kalirejo pada tahun 2020 masih tinggi yaitu sebanyak 218 ibu dengan presentase (68,1%). Berdasarkan hasil penelitian analisis gambaran paritas pada ibu bersalin di Rumah Sakit Az-Zahra Kalirejo pada tahun 2020 yaitu pada primipara sebanyak 132 kasus dengan presentase (31,3%), pada multipara yaitu 110 kasus dengan presentase (34,4%), dan pada grandemultipara sebanyak 78 kasus dengan presentase (24,4%).

Simpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis hubungan antara hubungan paritas dengan kejadian ruptur perineum di Rumah Sakit Az-Zahra Kalirejo pada tahun 2020, didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin.

Kata Kunci: *Paritas*, Rupture Perineum

Ngudi waluyo
University Faculty
of Health Sciences
Midwifery Study Program
Undergraduate Program Thesis,
February 2021

RELATIONSHIP OF PARITY WITH THE EVENT OF RUPTURE PERINEUM IN
NORMAL CIRCULAR WOMEN AT AZ-ZAHRA KALIREJO LAMPUNG
CENTRAL Hospital, 2020

ABSTRACT

Background: Childbirth is a process of releasing the products of conception (fetus and uri) which can live outside the uterus through the birth canal. Perineal rupture is a tear in a parallelogram- shaped space below the pelvic floor that occurs naturally without action at delivery. The purpose of this study was to determine the relationship between parity and the incidence of perineal rupture in normal delivery mothers at Az-Zahra Kalirejo Hospital, Central Lampug in 2020.

Methods: This type of research is a descriptive study. The population in this study were 320 women with normal delivery with the sampling technique using total sampling or saturated samples. The research instrument used was medical record data with univariate and bivariate analysis.

Results: This study shows that the incidence of perineal rupture in mothers giving birth at Az- Zahra Kalirejo Hospital in 2020 is still high, namely 218 mothers with a percentage (68.1%). Based on the results of the analysis of parity picture analysis in maternal at Az Hospital -Zahra Kalirejo in 2020, namely in primipara as many as 132 cases with a percentage (31.3%), in multiparous namely 110 cases with a percentage (34.4%), and in grandemultipara as many as 78 cases with a percentage (24.4%).

Conclusion: This study shows that based on the analysis of the relationship between the relationship between parity and the incidence of perineal rupture at Az-Zahra Kalirejo Hospital in 2020, it was found that there was a relationship between parity and the incidence of perineal rupture in mothers who gave birth.

Keywords: Parity, Perineal Rupture