

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan terdapat Gambaran Faktor Penyebab Bayi Dengan Ikterus Neonatus Di Rsud Sultan Syahrif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak pada periode Januari - september 2020 sebagai berikut :

1. Sebagian besar bayi dengan ikterus neonatorum memiliki berat badan lahir rendah sebesar 32 (33,6%).
2. Sebagian besar bayi dengan ikterus neonatorum memiliki asfiksia sebesar 11 (11,5%) bayi neonatus.
3. Sebagian besar bayi dengan ikterus neonatorum memiliki kelahiran bayi dengan jenis persalinan atau seksio sesarea sebesar 16 (16,8%).

#### **B. Saran**

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan faktor penyebab terjadinya ikterus pada neonatus. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor penyebab terjadinya ikterus pada neonatus maka perlu modifikasi variabel-variabel independen baik menambah variabel atau menambah time series datanya. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.

2. Bagi pihak RSUD Sultan Syahrif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak serta rumah sakit lainnya agar dapat lebih tepat waktu dan tidak mengulur waktu yang sudah dijanjikan dalam memberikan informasi, agar dapat mempercepat kerja sama antara peneliti dan pihak rumah sakit.