

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Balita usia 6-24 bulan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada kelompok kontrol sebagian besar mempunyai respon nyeri kategori berat yaitu sebanyak 14 anak (63,6%).
2. Balita usia 6-24 bulan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada kelompok intervensi sebagian besar mempunyai respon nyeri kategori ringan yaitu sebanyak 9 anak (40,9%).
3. Ada pengaruh menyusui terhadap respon nyeri balita usia 6-24 bulan pada penyuntikan imunisasi di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dengan  $p\text{ value } (0,001) < \alpha (0,05)$ .

#### **B. Saran**

1. Bagi ibu bayi  

Sebaiknya ibu balita usia 6-24 bulan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal memberikan tindakan menyusui saat penyuntikan imunisasi sehingga dapat menurunkan respon nyeri yang dialami oleh balita.
2. Bagi petugas kesehatan masyarakat (perawat)  

Perawat dapat memberikan informasi kepada ibu untuk memberikan tindakan menyusui pada balita usia 6-24 bulan saat penyuntikan sehingga dapat menurunkan respon nyeri yang dialami oleh balita.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya meningkatkan hasil penelitian ini dengan melakukan pengambilan data pretes sehingga diperoleh perbandingan data yang lebih optimal.

4. Bagi Puskesmas Desa Gempolsewu

Sebaiknya pihak puskesmas menyusun program penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman ibu balita dalam manajemen nyeri pada balita yang dibeirkan suntikan imunisasi.