

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis dan golongan antibiotik yang paling banyak digunakan untuk terapi antibiotik pada pasien diare akut anak di Instalasi Rawat Inap RSI Sultan Agung Semarang periode Juli-September tahun 2021 adalah golongan sefalosporin yaitu sebanyak 93,45% yang terbagi atas tiga jenis antibiotik yaitu Cefotaxime sebanyak 35 pasien (57,38%), Ceftriaxone sebanyak 19 pasien (31,15%) dan Cefixime sebanyak 3 pasien (4,92%). Selain golongan sefalosporin, juga digunakan Metronidazole pada 4 pasien (6,55%). Rute pemberian terbanyak yang digunakan adalah rute pemberian secara intravena sebanyak 95,08% dan secara peroral sebanyak 4,92%.
2. Evaluasi ketepatan antibiotik yaitu tepat indikasi sebanyak (100%), tepat pemilihan obat (100%), tepat dosis pemberian (75,41%), tepat interval waktu pemberian (100%) dan tepat lama pemberian sebanyak 19 pasien (31,15%).

B. Saran

Diharapkan untuk pihak rumah sakit dalam menuliskan keterangan pada lembar rekam medis lebih dilengkapi terutama pada hasil laboratorium dan kultur mikroba agar dapat mengetahui penyebab infeksi dan penggunaan

antibiotik dapat diberikan secara tepat (rasional) sehingga penyakit diare akut anak dapat terevaluasi dengan baik.