

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dipuskesmas bergas dari 17 sampel yang dianalisis berdasarkan pada PCNE terdapat kejadian DRPs pada pasien DM tipe 2 peserta prolanis. Katagori DRPs yang paling umum ditemui yaitu tidak ada efek terapi obat (M1.1), efek terapi obat tidak optimal (M1.2), ada indikasi atau gejala yang tidak diterapi (M1.3), pemilihan obat tidak sesuai dengan guideline/ formularium (P1.1), ada indikasi baru dan obat belum diresepkan (P1.6). sebanyak 70% mengalami 2 kasus DRPs, 18% mengalami 3 DRPs dan 12% mengalami 1 DRPs.
2. Dari 17 sampel penelitian didapatkan 12% mencapai target HbA1c terkontrol dengan tekanan darah terkontrol sebanyak 76% serta kadar LDL terkontrol sebanyak 0%.

#### **B. SARAN**

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai *Drug Related Problems* (DRPs), tingkat pengetahuan serta kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan tujuan untuk mendapatkan target terapi yang diinginkan.

2. Disarankan agar puskesmas Bergas mempunyai standar acuan untuk pengobatan diabetes melitus dengan komplikasi hipertensi dan dislipidemia agar dapat lebih mudah dalam memberikan pelayanan Kesehatan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini Dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.