

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah vaksinasi covid-19 pada anak usia sekolah di Puskesmas Pabelan Kab. Semarang, maka di dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian sebelum dilakukan vaksinasi terdapat 65 responden tidak mengalami kecemasan (19,5 %), 106 responden mengalami kecemasan ringan (31,8 %), 119 responden mengalami kecemasan sedang (35,7 %), dan 43 responden mengalami kecemasan berat (12,9 %).
2. Hasil penelitian sesudah dilakukan vaksinasi terdapat 287 responden tidak mengalami kecemasan (86.2 %), dan 46 responden mengalami kecemasan ringan (13.8 %).
3. Terdapat perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah vaksinasi covid-19 pada anak usia sekolah diperoleh nilai sig Pearson *Wilcoxon* sebesar $0,000 < 0,05$, artinya terdapat perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah vaksinasi covid-19 pada anak usia sekolah di Puskesmas Pabelan Kab. Semarang.

B. Saran

1. Bagi Institusi Kesehatan

Penelitian ini dapat dijadikan literatur terbaru mengenai tingkat kecemasan sebelum dan sesudah vaksinasi di perpustakaan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan adanya upaya untuk menurunkan kecemasan sebelum dan sesudah anak melakukan vaksinasi covid-19.

3. Bagi Sekolah

Anak usia sekolah yang akan melakukan vaksinasi covid-19 pasti akan mengalami kecemasan sebaiknya adanya dukungan dari guru atau teman sebaya agar dapat mengurangi kecemasan pada saat dilakukan vaksinasi.