

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dikatakan pasien covid-19 sebagian besar tidak mempunyai komorbid diabetes mellitus dengan nilai skor presentase yaitu 86,67%. Sedangkan pada penderita covid dengan komorbid memiliki nilai skor presentase yaitu 13,33%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penderita covid yang tidak memiliki komorbid diabetes mellitus memiliki nilai presentase yang lebih besar dibandingkan dengan penderita covid yang memiliki komorbid diabetes mellitus.
2. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dikatakan pasien covid-19 yang mempunyai komorbid diabetes mellitus kategori ringan atau tidak parah memiliki skor yaitu 18.41%, penderita covid-19 yang mempunyai komorbid diabetes mellitus dalam kategori parah yaitu dengan skor 26,1%. Sedangkan penderita covid-19 yang memiliki komorbid dm dalam kategori sangat parah atau kritis yaitu dengan skor 19,33. Maka dapat disimpulkan bahwa skor tertinggi yaitu 26,1 % maka kesimpulannya adalah penderita covid-19 yang mempunyai komorbid diabetes mellitus masuk kedalam kategori parah.
3. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan bahwa adanya hubungan komorbid diabetes mellitus terhadap tingkat keparahan penderita covid-19 dengan nilai $p < 0,0001$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan komorbid diabetes mellitus dengan tingkat keparahan penderita covid-19.

B. Saran

1. Bagi petugas kesehatan

Hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan terhadap petugas kesehatan bahwa adanya hubungan tingkat keparahan komorbid DM dengan penderita covid-19

2. Bagi institusi pendidik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa terutama dalam bidang keperawatan terkait perbandingan tingkat keparahan covid dengan komorbid dan covid tanpa komorbid

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis untuk mengembangkan dirinya dalam bidang keperawatan.