

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai profil penggunaan obat pada pasien stroke rawat jalan di RST Dr. Asmir Salatiga Periode Januari-Oktober tahun 2022 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa profil penggunaan obat pada pasien stroke non hemoragik golongan obat yang paling banyak digunakan yaitu antiplatelet sebanyak 28 pasien (30,43%), jenis obat yang sering digunakan yaitu Clopidogrel 21 pasien (26,25%), sedangkan pada stroke hemoragik paling banyak digunakan yaitu Neuroprotektan+ Neurotropik sebanyak 4 pasien (33,34), golongan antikoagulan jenis obat warfarin sebanyak 2 pasien (16,67%), penggunaan obat hipertensi sebagai terapi stroke paling banyak menggunakan golongan CCB jenis obat amlodipine sebanyak 26 pasien (49,05%), dan penggunaan obat dislipidemia sebagai terapi stroke paling banyak menggunakan golongan statin jenis obat simvastatin sebanyak 8 pasien (61,53%).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengingat keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu di sampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode prospektif sehingga dapat diketahui alasan

pemilihan suatu obat, dosis obat, dan pola penggunaan obat yang sebenarnya terhadap keberhasilan terapi pasien stroke rawat jalan.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi ketepatan penggunaan obat pada pasien stroke rawat jalan.