

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Profil penggunaan obat pada pasien gagal jantung rawat jalan di RSUD dr. Gunawan Magunkusumo periode Januari-November 2022 yaitu pada obat tunggal terbanyak adalah diuretik hemat kalium sebanyak 3 pasien (42,86%). Penggunaan obat jantung dua kombinasi yang terbanyak adalah diuretik tiazid (Hydroclorotiazide) dan ARB (Candesartan) sebanyak 12 pasien (37,50%). Penggunaan obat jantung tiga kombinasi yang terbanyak adalah diuretik thiazide + diuretik hemat kalium + diuretik loop sebanyak 3 pasien (15%). Penggunaan obat jantung empat kombinasi yang terbanyak adalah diuretik thiazide + beta blocker + Nitrate + Inotropik Agen sebanyak 2 pasien (33,33%). Kombinasi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi diuretik tiazid (Hydroclorotiazide) dan ARB (Candesartan) dengan persentase sebesar 17,91%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini saran yang di berikan sebagai berikut:

Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian prospektif lebih lanjut mengenai profil pengobatan gagal jantung terhadap keberhasilan terapi pasien gagal jantung dengan melihat kelas gagal jantungnya, apakah termasuk kelas 1-4 sesuai berdasarkan *New York Heart Association* (NYHA) dan penyakit penyerta sehingga dapat terlihat efek yang terjadi.