

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan dimana efek samping obat pada terapi antihipertensi pada pasien hipertensi rawat jalan di Puskesmas Bergas berdasarkan pedoman JNC 8 dan Algoritma Naranjo menunjukkan kejadian efek samping obat pada penggunaan amlodipin sebanyak 1 pasien (2,7%), amlodipin dan captopril 1 pasien (2,7%) dan kombinasi amlodipin dan candesartan yaitu 7 pasien (108,92%). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan efek samping obat yang terjadi pada pasien hipertensi di Puskesmas Bergas adalah akibat antihipertensi.

B. Saran

1. Saran bagi Institusi Puskesmas Bergas

Perlu dilakukan monitoring efek samping obat terhadap pasien yang merasakan keluhan dan melaksanakan pemeriksaan objektif.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

- a. Perlu penelitian serupa dengan jumlah sampel pasien terdiagnosa hipertensi saja yang lebih banyak, agar efek samping obat antihipertensi yang diperoleh lebih akurat.
- b. Penelitian ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika dilaksanakan di rumah sakit.
- c. Perlu dilakukan penelitian pada pasien rawat jalan dan rawat inap.

- d. Perlu dilakukan penelitian *multi center*.
- e. Perlu penjelasan lebih baik kepada responden agar memahami pertanyaan yang dijelaskan berdasarkan pada kuesioner Naranjo.