

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Ungaran pola terapi yang digunakan pada pengobatan Diabetes Melitus tipe 2 yaitu menggunakan obat tunggal (metformin) dan kombinasi (metformin+glimepiride). Dimana obat tunggal sebanyak 1 kasus (8,33%) sementara obat kombinasi sebanyak 11 kasus (91,7%) dari 12 sampel yang diambil.
2. 12 pasien Diabetes Melitus tipe 2 peserta prolanis Puskesmas Ungaran, dihasilkan DRPs sebanyak 12 kasus (100%) parameter HbA1c, parameter tekanan darah sebanyak 8 kasus (66,7%) dan pada parameter lipid sebanyak 11 kasus (91,7%).

B. Saran

1. Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis DRPs agar Puskesmas Ungaran memiliki standart acuan terapi pengobatan Diabetes Melitus tipe 2 peserta prolanis dan penderita Diabetes Melitus tipe 2 dengan komorbiditas

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai DRPs pada penderita Diabetes Melitus tipe 2 guna mencapai target terapi yang diinginkan.
3. Diharapkan hasil penelitian mampu dijadikan rujukan guna peneliti selanjutnya.