

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar responden yang mendapatkan vaksin AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac mengalami KIPI yaitu nyeri otot sebanyak 73 responden (85,9%), nyeri tempat suntikan sebanyak 69 responden (81,2%), mengantuk sebanyak 43 responden (50,6%), badan lemah sebanyak 42 responden (49,4%), demam sebanyak 41 responden (48,2%), pusing sebanyak 33 responden (38,8%), bengkak tempat suntikan sebanyak 29 responden (34,1%), dan nafsu makan meningkat sebanyak 28 responden (32,9%).
2. Mayoritas responden yang mendapatkan vaksin astraZeneca dan moderna melakukan penanganan dengan cara minum obat dan istirahat untuk menangani KIPI, sedangkan kebanyakan responden yang mendapatkan vaksin sinovac melakukan penanganan dengan cara istirahat yang cukup untuk menangani KIPI.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan keilmuan peneliti tentang kejadian yang dialami seseorang setelah mendapatkan vaksinasi.

2. Bagi Mahasiswa

Memperkaya wawasan mahasiswa tentang gambaran Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi setelah mendapatkan vaksin dan cara penanganannya.

3. Bagi Institut Pendidikan

Penelitian ini bisa menjadi informasi baru tentang gambaran KIPI di Wilayah Universitas Ngudi Waluyo untuk dijadikan sumber studi perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.