

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Kebidanan Program Sarjana,  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
Skripsi, Februari 2023  
Intan Permata Sari  
152211020

**DISKRIPSI FAKTOR RESIKO TERJADINYA RUPTUR PERINEUM  
PADA PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEMOWO  
TAHUN 2022**

**ABSTRAK**

**Pendahuluan** : Ruptur perineum adalah kondisi robeknya organ genital wanita yang umumnya terjadi pada saat melahirkan. Perineum merupakan area antara pembukaan vagina dan anus. Ruptur perineum dapat terjadi secara tiba-tiba maupun iatrogenik. Hal ini dikarenakan episiotomi dan persalinan dengan bantuan instrument.

**Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya *Ruptur Perineum* Pada Persalinan Normal di Wilayah Kerja Puskesmas Semowo Tahun 2022.

**Metode** : :

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Metode analitik adalah penelitian yang mencoba menggali bagaimana fenomena kesehatan itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena antara faktor risiko (paritas, berat badan bayi dan jarak kehamilan) dengan faktor efek (kejadian ruptur perineum).

**Hasil** : Hasil penelitian dari 93 sampel ibu mengalami ruptur perineum pada derajat II sebanyak 75 responden (80,6%), kategori multipara melahirkan 2-4x sebanyak 54 responden (58,1%), melahirkan bayi dengan berat 2500-4000 gram sebanyak 89 responden (95,7%), 44 responden (47,3%) jarak persalinan ibu >2 tahun, 82 responden (88,2%) merupakan umur ibu,

**Kesimpulan** : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Semowo didapati faktor penyebab terjadinya ruptur perineum terbanyak yaitu berdasarkan berat lahir bayi dengan 89 responden ((95,7%).

**Kata kunci** : *ruptur perineum, paritas, berat badan lahir, jarak kelahiran, umur*

Ngudi Waluyo University  
Undergraduate Midwifery Study Program,  
Faculty of Health Sciences T  
thesis, January 2023  
Intan Permata Sari  
152211020

**DESCRIPTION OF RISK FACTORS FOR PERINEAL RUPTER IN  
DELIVERY IN THE WORK AREA SEMOWO PUSKESMAS IN 2022**

**ABSTRACT**

**Introduction** : . Perineal rupture is a tearing condition of the female genital organs which generally occurs during childbirth. The perineum is the area between the opening of the vagina and anus. Perineal rupture can occur suddenly nor iatrogenic. This is due to episiotomy and childbirth with the help of instruments.

**Purpose** : Study This aim For know Factors Causing the Occurrence *Perineal Rupture* On Normal Labor in the Working Area of the Semowo Health Center 2022.

**Method** : :

In this study, researchers used *analytic methods* with a *cross-sectional approach*. The analytical method is research that tries to explore how health phenomena occur. Then analyze the dynamics of the correlation between the phenomena between risk factors (parity, baby weight and gestational distance) with effect factors (perineal rupture).

**Results** : Research results of 93 samples Mother experience perineal rupture in grade II as many as 75 respondents (80.6%), multipara category gave birth 2-4x as many as 54 respondents (58.1%), gave birth baby with weight 2500-4000 grams as many as 89 respondents (95.7%), 44 respondents (47.3%) distance labor mothers , 82 respondents (88.2%) were age mother ,

**Conclusion** : Based on results research conducted in health centers so cute found factor reason most perineal ruptures that is based on heavy born baby with 89 respondents ((95.7%).

**Keywords** : \_ *perineal rupture , parity, birth weight , distance birth, age*