

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini memiliki beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Gambaran kejadian efek samping penggunaan obat ARV pada pasien ODHA di RSUD menunjukkan bahwa sebagian besar pasien tidak mengalami efek samping dan tidak mengetahuinya dengan persentase sebesar 67,92%.
2. Gambaran tingkat kepatuhan penggunaan obat ARV pada pasien ODHA di RSUD Salatiga menunjukkan bahwa rata-rata pasien memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi sebesar 40,51%.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *p value* sebesar  $0,133 > 0,05$  yang artinya tidak ada hubungan signifikan antara tingkat efek samping dan tingkat kepatuhan penggunaan obat ARV pada pasien ODHA di RSUD Salatiga.

#### **B. SARAN**

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan pasien ODHA khususnya di RSUD Salatiga

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai jenis ARV yang digunakan pada pasien yang memiliki potensi munculnya efek samping obat pada pasien ODHA khususnya di RSUD Salatiga.
3. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai besarnya risiko efek samping yang muncul terhadap kepatuhan berdasarkan *odd ratio* variabel tersebut.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas efek terapi obat ARV pada pasien ODHA.