

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan dan kesimpulan penelitian ini didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Pasien gagal ginjal kronik sebagian besar sudah menjalani hemodialisa selama 13-24 bulan sebanyak 51 responden atau sebesar 46.8%.
2. Pasien gagal ginjal kronik sebagian besar mempunyai kualitas hidup sedang sebanyak 60 responden atau sebesar 55,0%.
3. Ada hubungan yang bermakna hubungan lama menjalani hemodialisa dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik di Klinik Ginjal & Hipertensi Lestari Semarang, dengan *p value* sebesar $0,048 < 0,05 (\alpha)$.

B. Saran

1. Bagi Responden

Untuk memaksimalkan status kesehatan pasien dan meningkatkan kualitas hidup, diharapkan pasien dapat memanfaatkan temuan penelitian tentang kualitas hidup pasien hemodialisis gagal ginjal kronik ini untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, dan kemauan berpartisipasi dalam meningkatkan motivasi pasien. untuk kepatuhan hemodialisis rutin. tinggi.

2. Bagi Peneliti

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak informasi dan keahlian dalam asuhan keperawatan kepada pasien hemodialisis yang mengalami gagal ginjal kronis saat berada di lapangan

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan hasil penelitian ini dengan meneliti seluruh pasien CKD tanpa mempertimbangkan frekuensi melakukan HD, jenis dialyzer hingga durasi penggunaan dialyzer sehingga diperoleh sampel yang lebih variatif.