

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap responden mengenai gambaran tingkat kecemasan pada anak yang melakukan sirkumsisi di Rania Care Bandungan dapat disimpulkan:

1. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 20 responden dengan mayoritas karakteristik tingkat pendidikan SD/Sederajat sebanyak 18 anak (90%) dan mayoritas pada karakteristik Usia rata-rata berusia 11 tahun sebanyak 10 anak (50%).
2. Sebagian besar tingkat kecemasan anak yang melakukan sirkumsisi di Rania Care Bandungan mengalami kecemasan kategori tidak cemas dengan data hasil sebanyak 15 anak (75%), kecemasan kategori cemas ringan sebanyak 4 anak (20%), dan kecemasan kategori cemas sedang sebanyak 1 anak (5%).

## B. Saran

### 1. Bagi Isntitusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### 2. Bagi profesi/ pelayanan kesehatan

Bagi profesi dapat diberikan pelatihan secara merata bagi seluruh perawat untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan perawat tentang pengendalian tingkat kecemasan pada anak yang melakukan sirkumsisi.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian berikutnya, seluruh informasi yang sudah dibahas pada penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan dibahas lagi oleh peneliti selanjutnya dan diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecemasan anak saat sirkumsisi, serta dapat melakukan intervensi dalam pengendalian cemas.