

**Universitas Ngudi Waluyo**  
**Program Study Kebidanan Program Sarjana**  
**Skripsi, Januari 2024**  
**NAWANG FATMASARI, KARTIKA SARI S.Si.T., M.Keb**  
**152221044**

**HUBUNGAN USIA DAN PARITAS IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN RUPTUR PERINEUM PADA PERSALINAN NORMAL DI KLINIK TRI KARYA KECAMATAN BANDUNGAN**

**ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Pendarahan postpartum merupakan salah satu penyumbang utama kematian ibu di Indonesia yaitu sebesar 40%. Pendarahan post partum terjadi salah satunya karena ruptur perineum. Ruptur perineum merupakan penyebab kedua dari pendarahan post partum, yang terjadi sekitar 50% kasus. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya ruptur perineum yaitu usia dan paritas ibu bersalin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan usia dan paritas ibu bersalin dengan kejadian ruptur perineum di Klinik Tri Karya Kecamatan Bandunagn.

**Metode penelitian:** Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan rancangan pendekatan *Cross sectional*. Pengambilan sampel dengan tootal sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di Klinik Tri Karya Kecamatan Bandungan pada bulan Januari-Desember 2023 dengan jumlah 110 ibu bersalin. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa catatan rekam medis, uji statistic menggunakan *chi square* SPSS 2023.

**Hasil Penelitian:** ibu yang memiliki usia beresiko terdapat 19 (17.3%), ibu dengan paritas primipara terdapat 52 (47.3%), dan ibu yang mengalami ruptur perineum sebanyak 79 (71.8%). Berdasarkan hasil analisis bivariat ddidapatkan tidak ada hubungan antara usia ibu bersalin dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal ( $p$  value = 0.842) dan pada paritas ibu bersalin tidak ada hubungan antara paritas ibu bersalin dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal ( $p$  value= 0.121)

**Simpulan:** tidak terdapat hubungan usia dan paritas ibu bersalin dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal. Terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin, diharapkan bagi ibu bersalin untuk rutin memeriksakan kehamilanya untuk memantau kesehatan ibu dan bayi, dan mengikuti senam hamil agar melatih otot perineum saat persalinan.

Kata Kunci : Usia ibu, paritas, ruptur perineum  
Kepustakaan : 56 (2015-2023)

**Ngudi Waluyo University**  
**Midwifery Study Program Undergraduate Program**  
**Thesis, January 2024**  
**NAWANG FATMASARI, KARTIKA SARI S.Si.T., M.Keb**  
**152221044**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE AND PARITY OF MATERNITY  
MOTHERS WITH THE INCIDENCE OF PERINEAL RUPTURE IN  
NORMAL DELIVERY AT TRI KARYA CLINIC BANDUNGAN DISTRICT**

**ABSTRACT**

**Background:** Postpartum hemorrhage is one of the leading contributors to maternal mortality in Indonesia, at 40%. Postpartum hemorrhage occurs one of them due to perineal rupture. Perineal rupture is the second leading cause of postpartum hemorrhage, which occurs in about 50% of cases. There are factors that cause perineal rupture, namely the age and parity of maternity mothers. The purpose of this study was to determine the relationship between age and parity of maternity mothers with the incidence of perineal rupture at Tri Karya Clinic, Bandunag District.

**Research method:** This type of research is correlation research with the design of *the Cross sectional approach*. Sampling by totoal sampling. The sample in this study is all maternity mothers at the Tri Karya Clinic, Bandungan District, in January-December 2023 with a total of 110 maternity mothers. This study used secondary data in the form of medical record records, statistical tests using *SPSS 2023* chi square.

**Research results: mothers who** have an at-risk age are 19 (17.3%), mothers with primiparous parity are 52 (47.3%), and mothers who experience perineal rupture as much as 79 (71.8%). Based on the results of bivariate analysis, it was found that there was no relationship between the age of the maternity mother and the incidence of perineal rupture in normal labor ( $p$  value = 0.842) and in the parity of maternity there was no relationship between the parity of maternity mothers and the incidence of perineal rupture in normal labor ( $p$  value = 0.121)

**Conclusion:** there is no relationship between age and parity of maternity mothers with the incidence of perineal rupture in normal delivery. There are other factors that cause perineal rupture in maternity women, it is expected for maternity mothers to routinely check their pregnancy to monitor the health of mothers and babies, and follow pregnancy exercises to train the perineal muscles during labor.

Keywords : Maternal age, parity, perineal rupture  
Libraries : 56 (2015-2023)