

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada kelompok kontrol sebelum penelitian mempunyai nyeri kanker sebagian besar kategori ringan yaitu sebanyak 10 orang (58,8%)
2. Pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada kelompok kontrol sesudah penelitian mempunyai nyeri kanker sebagian besar kategori ringan dan sedang yaitu sebanyak 11 orang (64,7%).
3. Pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada kelompok intervensi sebelum diberikan terapi musik mempunyai nyeri kanker sebagian besar kategori ringan yaitu sebanyak 10 orang (58,8%),
4. Pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada kelompok intervensi sesudah terapi musik mempunyai nyeri kanker sebagian besar kategori ringan yaitu sebanyak 14 orang (82,4%).
5. Tidak ada perbedaan secara bermakna nyeri kanker pasien kanker serviks pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah penelitian di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dengan *p-value* sebesar $0,148 > \alpha (0,05)$.
6. Ada perbedaan secara bermakna nyeri kanker pasien kanker serviks pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah diberikan terapi musik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dengan *p-value* sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$.

7. Ada pengaruh yang bermakna terapi musik terhadap nyeri kanker pada pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dengan *p-value* sebesar 0,043, lebih kecil dari α (0,05).

B. Saran

1. Bagi Peneliti dan masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya responden dapat menambah wawasan dan dijadikan acuan dalam mencari bantuan pelayanan kesehatan.

2. Bagi perawat dan profesi kesehatan lainnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk profesi keperawatan yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan pasien kanker serviks dengan nyeri kanker sehingga dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatannya.

3. Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan rujukan dalam pembelajaran terkait ilmu keperawat medikal bedah yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh terapi musik klasik terhadap nyeri kanker kanker serviks dan dapat dijadikan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya yang terkait dengan terapi musik klasik untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien kanker serviks.

4. Institusi Pelayanan Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pelayanan rumahsakit dan menjadi data dalam melakukan analisa tentang pengaruh terapi musik klasik terhadap nyeri kanker pada pasien kanker serviks.