

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus yang telah di bahas pada bab sebelumnya mengenai hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien *Skizoprenia* di Puskesmas terilolo Baucau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan karakteristik umur terdapat 17 responden (17,9%) yang berumur 40-56 th, 47 responden (49,5%) yang berumur 56-65 th, 31 responden (43,7%) yang berumur >65 th.
2. Gambaran dukungan keluarga hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Keluarga Penderita *Skizofrenia* di Puskesmas Terilolo Baucaui sebanyak 35 orang (36.8%) dukungan keluarha tinggi.
3. Gambaran kepatuhan minum obat hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan minum obat Penderita *Skizofrenia* di Puskesmas Terilolo Baucaui sebanyak 58 orang (61.1%) tidak patuh.
4. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan minum obat Penderita *Skizofrenia* di Puskesmas Terilolo Baucaui sebanyak 58 orang (61.1%) tidak patuh dan yang patuh minum obat sebanyak 37 responden (38,9%).
5. Berdasarkan uji *chi square* menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizoprenia di *Skizoprenia* di Puskesmas terilolo Baucau

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Bagi Tenaga Perawat Agar tetap mempertahankan serta meningkatkan upaya promotif dan Preventif khususnya program home visit pada penderita dengan Skizoprenia.

2. Bagi Keluarga Agar tetap memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang sakit khususnya berkaitan dengan kepatuhan kontrol pasien Skizoprenia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Agar dapat mengembangkan instrumen- instrumen penelitian yang dibutuhkan dan menganalisa hubungan dukungan keluarga.