

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada balita stunting di Desa Kalijambe dan Desa Tanjung Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, kesimpulan yang dapat diambil, antara lain :

1. Tidak ada perbedaan status gizi balita berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) antara sebelum dan sesudah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dengan *p-value* 0,219.
2. Ada perbedaan status gizi balita berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) antara sebelum dan sesudah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dengan *p-value* 0,037.
3. Tidak ada perbedaan status gizi balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) antara sebelum dan sesudah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dengan *p-value* 0,506.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan kelompok kontrol sebagai pembanding, memberikan kebutuhan asupan energi sesuai dengan standar komposisi PMT yaitu 225-275 kalori untuk balita usia 12-23 bulan dan 300-450 kalori untuk balita usia 24-59 bulan, memberikan makanan dalam bentuk makanan lunak, dan dapat menganalisis asupan lain di luar PMT yang dikonsumsi oleh balita seperti susu.