

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada frekuensi gambaran preeklamsi yaitu ibu bersalin yang mengalami preeklamsi yaitu sebanyak 34 kasus (50%), dan 34 ibu bersalin tidak preeklamsia (50%).
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengalami kecemasan saat bersalin yaitu sebanyak 41 orang (60,3%) dan 27 orang (39,7%) tidak mengalami kecemasan saat bersalin.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kejadian preeklamsia dengan rasa cemas pada ibu bersalin di Rumah Sakit Ken Saras dengan nilai signifikan sebesar 0,001.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, saran yang dapat disampaikan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai referensi bagi pembaca tentang hubungan kejadian preeklamsia dengan rasa cemas pada ibu bersalin.
2. Diharapkan pihak rumah sakit dapat memberikan informasi dan penanganan kecemasan kepada pasien yang akan bersalin, baik pasien normal ataupun yang mengalami preeklamsi.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap kecemasan pada pasien preeklamsi dengan mengkaji kepada pasien secara langsung.