

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian ASI eksklusif pada balita di Puskesmas Bergas Kabupaten Semarang Sebagian besar ibu memberikan ASI eksklusif sebanyak 55 responden (59,8%).
2. Kejadian pneumonia pada balita di Puskesmas Bergas Kabupaten Semarang Sebagian besar balita tidak pneumonia sebanyak 75 responden (81,5%).
3. Ada hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia pada balita di Puskesmas Bergas Kabupaten Semarang dengan nilai $p=0,011$.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua Balita

Orang tua balita diharapkan memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya untuk mencegah terjadinya pneumonia pada balita jika mempunyai rencana untuk punya anak lagi.

2. Bagi Instansi Kesehatan

Instansi kesehatan seperti Puskesmas dapat menambahkan cara pencegahan pneumonia dengan lebih menggambarkan upaya promotif pemberian ASI eksklusif dalam penyuluhan yang dilakukan kepada ibu balita.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian lain yang melakukan penelitian sejenis dapat mengobservasi pemberian ASI eksklusif secara langsung selama 6 bulan.