

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasien gagal ginjal kronik di RSUD Ungaran lama menjalani hemodialisa paling rendah 3,00 bulan dan paling lama 84,00 bulan dengan nilai tengah 24,0000 bulan.
2. Pasien gagal ginjal kronik di RSUD Ungaran memiliki tingkat depresi terbanyak yaitu depresi ringan berjumlah 24 orang (35.3%).
3. Ada hubungan yang signifikan lama menjalani hemodialisa dengan tingkat depresi pada pasien gagal ginjal kronik di RSUD Ungaran, dengan *p-value* sebesar 0,009 ($\alpha < 0,05$) dengan nilai korelasi -0,314 yang menunjukkan kekuatan hubungan dalam kategori lemah (0,200-0,399) dengan arah negatif.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan tenaga kesehatan khususnya perawat dapat memberikan informasi tentang lamanya menjalani hemodialisa dapat menyebabkan depresi, sehingga menjadikan pasien lebih peduli dengan kondisi psikososial dan psikologinya selama menjalani terapi hemodialisa.

2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan rumah sakit dapat memberikan masukan pelaksanaan perawatan untuk memacu kesembuhan pasien yang menjalani hemodialisa dengan melibatkan aspek psikologis pasien.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya meningkatkan hasil penelitian ini dengan mengendalikan faktor lain seperti dukungan keluarga, jenis pelayanan umum atau asuransi.