

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi dosis Seftriakson pada pasien rawat inap di RSI Sultan Agung Semarang periode Januari – Maret 2019, meliputi:

1. Dosis Seftriakson tepat sebesar 99%, dosis kurang sebesar 1%, dan dosis berlebih sebesar 0%.
2. Frekuensi pemberian Seftriakson tepat sebesar 66%, pengaturan dosis kurang sering sebesar 0%, dan pengaturan dosis terlalu sering sebesar 34%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Bagi pihak RSI Sultan Agung Semarang, perlu adanya pemantauan dalam penggunaan antibiotik oleh apoteker dan tenaga medis lain untuk memaksimalkan penggunaan antibiotik yang tepat.
2. Bagi pihak RSI Sultan Agung Semarang, diperlukan perbaikan kelengkapan data dan kejelasan dalam pencatatan rekam medis, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Bagi peneliti selanjutnya, melakukan evaluasi secara menyeluruh dari Seftriakson rawat inap, obat yang dibawa pulang, sampai pemeriksaan ulang.