

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dari 5 jurnal untuk penyakit ISPA pada anak dengan metode pendekatan meta analisis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan jenis obat yang paling banyak digunakan oleh pasien ISPA yaitu Amoksisillin golongan penisillin dan penggunaan antibiotik selanjutnya yang paling banyak digunakan Kotrimoksazol.
2. Kerasionalan penggunaan obat antibiotik dilihat dari frekuensi pemberian penggunaan antibiotik, dalam 5 artikel penelitian didapatkan hasil frekuensi pemberian obat antibiotik masih banyak yang tidak rasional baik penggunaan antibiotik yang di salah gunakan atau frekuensi pemberian obat tidak tepat sesuai pedoman kesehatan sehingga perlu dilakukan penelitian secara lanjut.

#### **B. Saran**

Penelitian selanjutnya mengenai ketepatan penggunaan antibiotik Pada ISPA perlu dilakukan penelitian kajian pengobatan yang lebih lengkap baik di rawat inap atau rawat jalan, penelitian selanjutnya perlu menggali informasi lebih lanjut terkait kriteria tepat menurut Kemenkes RI (2011) tentang POR, sehingga tercapai obat rasional serta dapat mencegah terjadinya peningkatan resistensi dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian

