

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Golongan antibiotik yang sering digunakan untuk terapi pada pasien anak penderita demam tifoid di instalasi rawat inap RSI Sultan Agung Semarang tahun 2019 adalah golongan sefalosporin, terdapat dua jenis yaitu seftriakson sebanyak 80 pasien (88,89%) dan sefotaksim sebanyak 10 pasien (11,11%).
2. Evaluasi ketepatan dosis berdasarkan panduan *Drug Information Handbook 24 Edition*, dosis tepat sebanyak 73 pasien (81,11%) dan dosis kurang sebanyak 17 pasien (18,89%). Sedangkan apabila ditinjau dari ketepatan frekuensi adalah sebanyak 80 pasien (88,89%) dan sebanyak 10 pasien (11,11%) frekuensi pemberian obat kurang.

B. Saran

1. Bagi pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan

Diharapkan dalam pemberian obat antibiotik lebih diperhatikan untuk dosis dan interval penggunaannya khususnya pada pasien anak agar tercapai pemberian obat yang rasional dan tepat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang ketepatan pengobatan diantaranya durasi pengobatan pada pasien demam tifoid dengan tempat dan subjek yang berbeda.