

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Efektivitas terapi antiplatelet tunggal dan kombinasi pada pasien stroke iskemik di beberapa rumah sakit tidak menunjukkan perbedaan efektivitas yang begitu besar dalam mengurangi stroke berulang, infark miokard dan kematian tetapi terdapat perbedaan pada efek samping obatnya. Penggunaan terapi kombinasi lebih beresiko terjadi efek samping obat dibandingkan terapi antiplatelet tunggal.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan efektivitas terapi antiplatelet tunggal dan kombinasi pada pasien stroke iskemik ataupun pada penyakit lainnya dengan cara prospektif.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan efektivitas terapi antiplatelet tunggal dan kombinasi pada pasien stroke iskemik berdasarkan lama penyakit.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan efektivitas terapi antiplatelet tunggal dan kombinasi pada pasien stroke iskemik berdasarkan kepatuhan dalam menjalani terapi.
4. Alangkah baiknya dilakukan penelitian yang berkelanjutan dengan mengambil data langsung di lapangan.