

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan review pada 5 jurnal artikel penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Gambaran pola penggunaan obat didapatkan hasil bahwa pengobatan antipsikotik kombinasi lebih banyak digunakan daripada antipsikotik tunggal. Pola penggunaan antipsikotik diperoleh rentang persentase untuk penggunaan obat tunggal sebesar 4,92% - 100% dan penggunaan obat kombinasi diperoleh rentang persentase sebesar 88,66% - 95,08%.
- 2) Kerasionalan penggunaan obat antipsikotik pada pasien skizofrenia di rumah sakit dengan kategori tepat indikasi sebesar 20% - 100% dengan nilai rata-rata 60%. Kategori tepat obat sebesar 76,67% - 100% dengan nilai rata-rata 88,33%. Kerasionalan pada kategori tepat dosis sebesar 96,7% - 100% dengan nilai rata-rata 98,35%. Kerasionalan pada kategori tepat pasien sebesar 100%.

B. Saran

- 1) Bagi rumah sakit dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat hasil ketidaktepatan, ketidaktepatan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak rumah sakit untuk meningkatkan kerasionalan penggunaan obat antipsikotik untuk pasien skizofrenia.

- 2) Bagi peneliti lain yang melakukan, sebaiknya evaluasi rasionalitas penggunaan obat antipsikotik untuk pasien skizofrenia menggunakan data yang lebih lengkap.